

INCI UE
CETEARYL ALCOHOL
CAS
67762-27-0 / 8005-44-5

Assorbimento dermico %
Dato non disponibile

NOAEL (mg/kg bw/day)
1000

NOTE (*)
Rat (oral) - OECD SIDS 2006

(*) LEGENDA:

La sintetica descrizione del tipo di studio da cui è derivato contiene le seguenti informazioni:

Tipo di animale (via di somministrazione) - tipo di tossicità FONTE

I tipi di tossicità corrispondono alle seguenti definizioni:

Tipo di tossicità	Durata dello studio
Short term	Inferiore a 90 giorni Si tratta in genere di studi a 28 giorni
Subchronic	90 giorni (13 settimane) Si tratta comunque di studi inferiori a 1 anno
Chronic	1 o 2 anni, in base alla specie di animale impiegata
Developmental and reproductive toxicity (2-generation toxicity)	Studi condotti su due generazioni di animali
Carcinogenicity	2 anni
Teratogenicity	Studio dei danni congeniti indotti durante lo sviluppo embrionale e del feto

La dicitura “read across” indica che i dati tossicologici riportati sono relativi ad una sostanza che per analogia strutturale o funzionale può essere assimilata sotto il profilo tossicologico all’ingrediente in esame.